

Boletín Chileno de Herpetología 2: 29 (2015)

Registro de *Liolaemus pictus* (Duméril & Bibron 1837) (Squamata: Liolaemidae) con dos colas

Carlos Castro-Pastene

Correspondencia a: lynchailurus@yahoo.com

Durante el verano de 2013, en la Reserva Natural Nasampulli, ubicada en la pre-cordillera de la Región de la Araucanía, entre las comunas de Cunco y Melipeuco, se encontró un individuo de *Liolaemus pictus* que presentaba dos colas (Fig. 1). El individuo al ser fotografiado se ocultó impidiendo mayores observaciones. Las malformaciones en la cola de lagartos ocurren cuando pierden este miembro, fenómeno conocido como autotomía caudal y el cordón cartilaginoso sufre alteraciones en su regeneración, ocurriendo un proceso de crecimiento de manera anómala. A pesar de ser un fenómeno relativamente común en terreno y reportado para varias especies del género *Liolaemus*, hasta la fecha es desconocido si en todas las especies de lagartos en Chile ocurre regeneración de la cola con anomalías. Esta nota aporta al conocimiento de este fenómeno.

Recibido: Abril 2015
Aceptado: Mayo 2015
Publicado: Diciembre 2015
Editor a cargo: F.A. Urrea



Figura 1: *Liolaemus pictus* con dos colas fotografiada en Reserva Natural Nasampulli.