

Boletín Chileno de Herpetología 5: 39-40 (2018)

Registros de patrones de coloración de *Tachymenis chilensis chilensis* (Schlegel 1837) (Squamata, Dipsadidae) en las Regiones del Maule, Biobio y Araucanía

Records of coloration patterns of *Tachymenis chilensis chilensis* (Schlegel 1837) (Squamata, Dipsadidae) in the Maule, Biobio and Araucanía Regions

Edgardo Flores

Agrupación Nahuelbuta Natural.
Correspondencia a: edgardtefor@gmail.com



Figura 1: **A:** *T. chilensis* registrada en la comuna de Curanilahue, Región del Biobío 644397 E - 5852109 S, 200 msnm. **B:** *T. chilensis* registrada en la Comuna de Carahue, Región de la Araucanía 653506 E - 5735060 S, 650 msnm. **C:** *T. chilensis* registrada en la Comuna de Cañete, Región del Biobío 643522 E - 5821088 S, 120 msnm. **D:** *T. chilensis* registrada en la Comuna de Cañete, Región del Biobío 671134 E - 5817312 S, 1260 msnm. **E:** *T. chilensis* registrada en la Comuna de Cauquenes, Región del Maule 735948 E - 6022089 S, 190 msnm. **F:** *T. chilensis* registrada en la Comuna de San Clemente, Región del Maule 304146 E- 6062635 S, 600 msnm. **G:** *T. chilensis* registrada en la Comuna de Chillán, Región del Biobío 280449 E - 5915938 S, 1876 msnm.

Tachymenis chilensis chilensis es una culebra de tamaño medio que nunca supera el metro de longitud, cuya distribución en Chile es desde la Provincia de Cachapoal a la Isla de Chiloé y en Argentina en las provincias de Neuquén y Chubut (Nenda et al. 2017). El largo de la cola corresponde aproximadamente a un quinto

de la longitud total. Diseño de la cabeza formado por líneas y manchas negras pre, sub y postoculares. Diseño y coloración del cuerpo muy variable y dependiente de su origen geográfico, generalmente con fondo café grisáceo sobre el que se dispone una banda dorsal clara bordeada a ambos lados por bandas angostas negras. La coloración es variable incluyendo colores café melánico,

verde hasta un patrón general rojizo sin diseño (Ortiz 1973). Dado que se desconoce un registro geográfico de las variaciones fenotípicas de *T. chilensis chilensis*, en este trabajo se describen diferentes fotografías de especímenes encontrados en la Región del Maule, Biobío y Araucanía. Las imágenes presentadas corresponden a registros realizados en las cercanías de la Cordillera de Nahuelbuta, Región del Biobío y Araucanía (a,b,c, y d), Cauquenes (e) y Vilches, Región del Maule (f) Todos los ejemplares encontrados presentaron colores café claro a café rojizo con ausencia de diseño dorsal o con diseño difuso con una línea vertebral blanca acompañada de banda segmentada negra. Estas observaciones aportan al conocimiento de las variaciones fenotípicas de esta especie.

Agradecimientos

A Vicente Rosales Fuenzalida, por su registro en la comuna de Cauquenes y a Félix Urrea por motivarme a escribir esta nota naturalista y por sus registros en las comunas de San Clemente y Chillán.

Referencias

NENDA JS, BL BLOTTO, MO PEREYRA, PDP PINHEIRO & AR GIRAUDO (2017) Occurrence of *Tachymenis chilensis chilensis* (Schlegel, 1837) (Reptilia: Serpentes: Dipsadidae) and other herpetological fauna from Epu Lauquen Natural Protected Area, Neuquén, Argentina. Checklist 13(2): 2079.

ORTÍZ JC (1973) Étude sur le status taxonomique de *Tachymenis peruviana* Wiegmann et *Tachymenis chilensis* (Schlegel) (Serpentes: Colubridae). Bulletin du Muséum d'Historie Naturelle (3 Série) 110 (146): 1021-1039.

Recibido: Julio 2018

Aceptado: Octubre 2018

Publicado: Diciembre 2018

Editor a cargo: Félix A. Urrea