

Boletín Chileno de Herpetología 7: 84 (2020)

Conducta de depredación de *Parabuteo unicinctus* (Temminck 1824) (Accipitriformes, Accipitridae) sobre *Philodryas chamissonis* (Wiegmann 1835) (Squamata, Dipsadidae) en una serranía del norte de Chile

Predatory behavior of *Parabuteo unicinctus* (Temminck 1824) (Accipitriformes, Accipitridae) on *Philodryas chamissonis* (Wiegmann 1835) (Squamata, Dipsadidae) in a mountain range in northern Chile

César Piñones-Cañete

Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile (ROC).
Correspondencia a: cesarpinones@redobservadores.cl

Cerca de las 18:40 pm del día 25 de febrero de 2020, durante un recorrido vehicular por la ruta D-895 sector El Quelón (31° 21' 53.2"S 71°14'49.8"O), cerca de la localidad de Los Pozos (Comuna de Canela, Región de Coquimbo), se registró un ejemplar inmaduro de peuco, *Parabuteo unicinctus* (Temminck 1824), sobrevolando a baja altura y en línea recta, portando entre sus garras un ejemplar vivo y adulto de culebra de cola larga, *Philodryas chamissonis* (Wiegmann 1835). Tras atravesar la ruta, el ave se posó en un poste de madera de la alameda perimetral de la carretera y comenzó a devorar a la culebra por su cabeza, mientras esta aún ofrecía resistencia.

Aparentemente, debido al ruido y movimiento derivado del tránsito vehicular, el peuco bajó del poste y voló un par de metros a una ladera escarpada de rocas, en donde continuó devorando a la culebra siempre por su porción anterior. Esta seguía presentando movimientos bruscos de su cuerpo, pese a que su cabeza ya se encontraba completamente destrozada por la acción cortante del pico del ave (Fig. 1). Durante todo el proceso, el peuco se mostró muy alerta y sosteniendo con sus garras el cuerpo de la culebra.

Después de alrededor de 10 min., el peuco voló con su presa hacia una percha más elevada y protegida dentro de la misma ladera de cerro, la cual estaba rodeada de vegetación xerofítica propia del sector, como cactáceas y otras suculentas, en donde continuó desgarrando y consumiendo el ejemplar de *Philodryas chamissonis* que aún presentaba movimientos. Tras la distancia que tomó el ave con el observador, no se pudo obtener más detalle de la escena y no

se continuó con la observación en terreno de la interacción de estos dos depredadores.



Figura 1: *Parabuteo unicinctus* desgarrando la cabeza de *Philodryas chamissonis*, tras la captura.

Recibido: Marzo 2020
Aceptado: Diciembre 2020
Publicado: Diciembre 2020

Editor en jefe: Félix A. Urra